



ไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มีอยู่หลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

การรักษา



ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอล

ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง กระสับกระส่าย มีไข้เกิน 3 วัน ให้รีบนำส่ง sw. ทันที

อาการ

1



มีไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ อาเจียน

2



มีผื่น จุดสีแดง ขึ้นตามลำตัว แขนขา หรือถ่ายอุจจาระดำ

3




มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาและเร็ว

4



ตับโต มักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน



ป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวดในบ้าน และทายากันยุง



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบ้านให้สะอาด



หากมีอาการนำสงสัย ควรรีบพบแพทย์

